Processo Seletivo
Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde 2014

CADERNO DE PROVA

Dia: 02 de fevereiro de 2014

Prova: **11-Enfermeiro - Residencia Multiprofissional em Saude da Familia**

Leia com atenção:

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e, quando for autorizado pelos fiscais de sala.
02. Confira seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. A prova terá duração de 3 horas; O(a) candidato(a) só poderá ausentar-se da prova após transcorridas 1h30.
04. Autorizado o início, verifique se este caderno contém 40 questões e se a prova condiz com a opção escolhida.
05. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
07. Confira, na sua Folha de Respostas, todos os seus dados impressos.
08. Para marcar a Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, em nenhuma hipótese, ela será substituída.
09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo(a).
10. Não será permitido ao candidato(a) levar consigo a prova, a mesma deve ser entregue juntamente com a Folha de Respostas aos fiscais de sala.
11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusiva mente ao candidato interpretar e decidir.
12. A comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde do IMIP, deseja a todos uma boa prova.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

⇨ **As questões 1 a 20 são referentes a prova Específica de SAÚDE COLETIVA.**

1. Quais dos sistemas de informações abaixo podem ser utilizados pelas equipes de saúde para monitoramento de crianças de baixo peso?

A. SIAB e SIA
B. SIAB e SIM
C. SIM e SIA
D. SIAB e SISVAN
E. SIM e SINAN

2. Qual das opções abaixo NÃO se constitui um dos atributos da atenção primária a saúde?

A. Longitudinalidade
B. Integralidade
C. Coordenação do cuidado
D. Orientação familiar e comunitária
E. Fragmentação da assistência

3. O momento do planejamento onde são estabelecidas as conexões entre as causas e consequências dos problemas abordados é:

A. Momento situacional
B. Momento normativo
C. Momento explicativo
D. Momento estratégico
E. Nenhuma das respostas anteriores

4. Qual o instrumento de gestão que vem sendo utilizado para monitoramento do desempenho do sistema dos serviços de saúde:

A. Pacto da atenção básica
B. Programação pactuada integrada
C. Indicadores da atenção básica
D. Pacto de Gestão
E. Nenhuma das respostas anteriores

5. A Promoção da Saúde tem como um de seus componentes a Educação em Saúde. São ações de Promoção da Saúde, EXCETO:

A. Reunião com grupos de hipertensos e diabéticos.
B. Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
C. Vacinação de contactantes de caso de sarampo.
D. Orientação à gestante quanto à amamentação.
E. Orientação de atividade física na Academia da Cidade.

6.“Processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem um maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde, tornando-os aptos a analisarem sua realidade, de modo a propor alternativas que melhorem sua vida dentro do contexto e o ambiente onde eles vivem, de modo a controlar riscos e danos a sua saúde”.
Podemos afirmar que a definição anterior retrata qual princípio da promoção de saúde:

A. Intersetorialidade
B. Educação em saúde
C. Empoderamento
D. Reorientação dos serviços de saúde
E. Participação social

7. No modelo de vigilância à saúde, a razão dos óbitos registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e no Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB), em um município com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, deve ser igual a:

A. 1
B. >1
C. <1
D. 0
E. Nenhuma das respostas anteriores.

8. Relacione a coluna abaixo com as definições que se completam:

1. Controle Social
2. Equidade
3. Integralidade
4. Acolhimento
5. Intersetorialidade

( ) Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.
( ) Ações comunicacionais, ato de receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, dando respostas adequadas a cada demanda, em todo o percurso da busca (recepção, clínica, encaminhamento externo, retorno, remarcação e alta).
( ) Participação dos usuários na gestão do SUS. Seus fóruns oficiais são as Conferências e os Conselhos de Saúde.
( ) Um maior valor de financiamento das ações assistenciais para os municípios de menor IDH.
( ) Articular vários setores da sociedade em prol da melhoria da saúde da população.
Marque a alternativa **CORRETA:**

A. 1;2;3;4;5 B. 5;3;1;4;2 C. 3;4;1;2;5 D. 4;3;1;2;5 E. 2;3;4;5;1

9. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO é correto afirmar:

A. Tem como legislação básica as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.
B. O controle social consta como um dos seus princípios e diretrizes.
C. Seus recursos financeiros têm fontes diversas e são depositados em conta especial (Fundos de Saúde), em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
D. Exclui a participação da iniciativa privada mesmo quando os serviços públicos são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
E. Executa ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito

10. O objetivo da Emenda Constitucional nº 29 foi:

A. Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Primária à Saúde;
B. Aprovar o Pacto pela Saúde;
C. Assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
D. Regulamentar a regionalização da assistência à saúde;
E. Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Nordeste.

11. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, relativas ao controle da tuberculose, NÃO SE APLICA:

A. Solicitar pesquisa de BK no escarro;
B. Buscar os sintomáticos respiratórios;
C. Referenciar todos os casos diagnosticados de tuberculose para o serviço de referência especializado;
D. Notificar todos os casos à Secretaria Municipal de Saúde
E. Realizar tratamento supervisionado.

12. NÃO se considera um dos princípios organizativos do SUS:

A. Participação social
B. Centralização
C. Comando único
D. Regionalização
E. Hierarquização

13. São medidas de prevenção terciária, EXCETO:

A. Próteses e órteses
B. Fisioterapia
C. Reabilitação
D. Terapia Ocupacional
E. Evitar sequelas

14. A definição de território utilizada no processo de organização local da Estratégia Saúde da Família deve ser compreendida como:

A. Um espaço onde encontramos os três níveis de atenção à saúde.
B. Um espaço dinâmico, "vivo", em processo de construção e reconstrução.
C. Uma área com indicadores epidemiológicos homogêneos.
D. Uma área delimitada por características geográficas marcantes.
E. Nenhuma das respostas anteriores.

15. Sobre as características do processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, assinale "C" nas alternativas corretas e "E" nas erradas e em seguida assinale a alternativa correta.

( ) I. Promover à assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento as urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada.
( ) II. Planejar ações que promovam assistência apenas aos grupos de risco.
( ) III. Responsabilização sanitária para com os indivíduos / famílias de um determinado território definido.
( ) IV. Realizar planejamento em saúde sem possibilidades para readequações.
( ) V. Promover uma atenção integral, contínua e organizada.

Estão CORRETAS apenas:

A. II, IV, V
B. I, III, IV, V
C. I, III, V
D. III, IV, V
E. Nenhuma das respostas anteriores.

16. Segundo a OPAS (2005), os componentes que caracterizam um Sistema de Saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) são:

( ) Acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção; orientação familiar e comunitária; organização da gestão otimizadas.
( ) Intersetorialidade; participação; sustentabilidade; solidariedade e enfoque na doença.
( ) Acesso universal; territorialização; cadastramento individual; políticas e programas centralizadoras.
( ) Políticas e Programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos adequados; sustentáveis e ações intersetoriais com enfoques comunitários.

Assinale a alternativa CORRETA:

A. V, V, F, F
B. F, V, V, F
C. V, F, V, F
D. V, F, F, V
E. Nenhuma das respostas anteriores.

17. Constituem antecedentes históricos da Saúde Coletiva, EXCETO:

A. Medicina Social.
B. Medicina Preventiva.
C. Medicina Baseada em Evidências.
D. Polícia Médica na Alemanha, Medicina Urbana na França e Medicina da força de trabalho na Inglaterra.
E. Movimento da Reforma Sanitária no Brasil

18. A frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo, denomina-se:

A. Morbidade.
B. Incidência.
C. Letalidade.
D. Prevalência.
E. Transmissibilidade.

19. O Pacto pela Vida (2006) é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:

A. Saúde do idoso.
B. Controle do câncer do colo de útero e da mama.
C. Fortalecimento da atenção básica.
D. Promoção da saúde.
E. Redução da mortalidade por acidentes de trânsito.

20. Considerando que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que buscam garantir a integralidade do cuidado (MS/ 2010). Assinale a alternativa ERRADA:

A. A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura as mulheres uma atenção humanizada à gravidez, às crianças um nascimento seguro e aos homens o acesso às unidades de saúde no terceiro turno.
B. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
C. São consideradas redes prioritárias pelo Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.
D. São componentes e interface da Rede de Urgência e Emergências (RUE): SAMU 192, Atenção Domiciliar e leitos de retaguarda.
E. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como um de seus objetivos desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.

⇨ **As questões 21 a 40 são referentes a prova Específica de ENFERMAGEM.**

21. Nas Unidades de Saúde da Família– USF são oferecidos alguns serviços cujos materiais utilizados necessitam de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. Dentre as assertivas abaixo marque alternativa que indica o CORRETO protocolo de limpeza e desinfecção dos materiais para nebulização.

a) Lavar com água e sabão, secar por 20 minutos e guardar em recipiente limpo e fechado.
b) Depois da lavagem e secagem, mergulhar os materiais em solução de hipoclorito de sódio a 3% por 20 minutos.
c) Depois da lavagem e secagem, mergulhar os materiais em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos e em seguida guardar em recipiente limpo, seco e fechado.
d) Lavar com soro fisiológico as máscaras e guardar em recipiente limpo, seco e fechado.
e) Depois da lavagem e secagem, mergulhar os materiais em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos, em seguida enxaguar todos os componentes, secar e guardar em recipiente limpo, seco e fechado.

22. Há diferentes métodos contraceptivos que são disponibilizados pelo SUS. Os métodos anticoncepcionais reversíveis adquiridos atualmente pelo Ministério da Saúde são: Pílula combinada, Minipílula, Pílula de emergência, injetável mensal, injetável trimestral, preservativo masculino, diafragma e DIU Tcu-380 A (DIU T de cobre). Quanto aos contraceptivos injetáveis é INCORRETO afirmar:

a)A primeira injeção deve ser feita no primeiro dia, tendo como prazo máximo indicado o terceiro dia do início da menstruação.
b) As aplicações subsequentes devem ocorrer a cada 30 dias, mais ou menos três dias, independentemente da menstruação.
c) O anticoncepcional injetável combinado mensal oferece proteção anticoncepcional já no primeiro ciclo de uso.
d) Deve-se aplicar por via intramuscular profunda, na parte superior do braço (músculo deltoide) ou na nádega (músculo glúteo, quadrante superior lateral).
e) Se houver atraso de mais de três dias para a aplicação da nova injeção, a mulher deve ser orientada para o uso da camisinha ou evitar relações sexuais até a próxima injeção.

23. Durante a 1° consulta de pré-natal são solicitados alguns exames de rotina. Dos exames listados abaixo, qual (is) deverá (ao) ser repetidos próximos à 30° semana.

I) Dosagem de Hb/Ht, VDRL, Glicemia Jejum.
II) Sumário de Urina Tipo I, glicemia jejum, VDRL, Sorologia anti-HIV
III) Grupo Sanguíneo e Fator Rh, glicemia jejum, VDRL, Sorologia anti-HIV

a)Todas estão corretas
b) I e III estão corretas
c) II e III estão corretas
d) I e II estão corretas
e) Apenas a II está correta

24. A Idade Gestacional (IG) e data provável do parto (DPP) tem como principal parâmetro a data da última menstruação (DUM). Quando a data e o período do mês não são conhecidos, a IG é determinada por aproximação utilizando como parâmetro a altura de fundo de útero (AFU), toque vaginal e a data do início dos movimentos fetais. Quanto a AFU é CORRETO afirmar:

a) Até a 8º semana, não ocorre alteração no tamanho uterino e os movimentos fetais habitualmente ocorrem entre 16 e 20 semanas.
b) Na 10º semana, o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual e os movimentos fetais habitualmente ocorrem entre 10 e 15 semanas.
c) Na 16º semana, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical e os movimentos fetais habitualmente ocorrem entre 16 e 20 semanas.
d) Na 12º semana, o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual e os movimentos fetais habitualmente ocorrem entre 10 e 15 semanas.
e) Na 8º semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho normal e os movimentos fetais habitualmente ocorrem entre 10 e 15 semanas.

25. A deficiência de vitamina A é responsável por uma série de problemas de saúde. A sigla mais conhecida para determinar este problema é VAD, da terminologia em inglês Vitamin A Deficiency. Dentre as funções da VIT A, assinale a alternativa CORRETA.

I)A ação da vitamina A na visão dá-se em razão de sua combinação com a opsina no segmento exterior dos bastonetes da retina.
II)A vitamina A atua nas células produtoras de queratina em vários tecidos epiteliais do organismo, e na ausência desta, ocorre ressecamento epitelial denominado de xerose, tipicamente encontrado na conjuntiva e na córnea
III)A vitamina A atua nos processos de manutenção da imunocompetência, principalmente em relação aos linfócitos, de respostas mediadas pelas células T e de ativação de macrófagos.
IV) A administração de megadose como medida preventiva é: crianças de 6 meses a 11 meses de idade – 1 megadose na concentração de 100.000 UI; crianças de 12 a 59 meses de idade – 1 megadose na concentração de 200.000 UI a cada 6 meses e para puérperas – 1 megadose na concentração de 200.000 UI,

a) Todas estão corretas
b) I, II e III estão corretas
c) II e III estão corretas
d) II, III e IV estão corretas
e) I e III estão corretas

26. Durante a amamentação é possível surgir algumas complicações, tais como, mastite, traumas mamilares, ingurgitamento mamário, candidíase, o fenômeno de Raynaud entre outros. Leia atentamente as assertivas abaixo e assinale a Verdadeira (V) ou Falso (F).

I) Durante o fenômeno de Raynaud muitas mulheres relatam dor em "fisgadas" ou sensação de queimação enquanto o mamilo está pálido e por isso muitas vezes essa condição é confundida com candidíase.
II) O sabor do leite materno costuma alterar-se nas mastites, tornando-se mais salgado devido a um aumento dos níveis de sódio e uma diminuição dos níveis de lactose. Tal alteração de sabor pode ocasionar rejeição do leite pela criança.
III) Galactocele é uma formação cística nos ductos mamários contendo líquido leitoso, pus e sangue, que no início é fluido, adquirindo posteriormente aspecto viscoso, que pode ser exteriorizado por meio do mamilo.

a)V,V,F b)V,V,V c)F,F,F d)F,V,V e) V,F,V

27. Em idosos e portadores de doenças crônicas, inclusive diabetes, algumas doenças imunopreviníveissão responsáveis pela alta mortalidade e morbidade nesses grupos, tornando assim necessário a indicação de algumas vacinas. As vacinas indicadas para portadores de Diabetes tipo 2 são:

a)Vacina contra Influenza (Hib) + Vacina contra infecção por pneumococo
b)Vacina contra Influenza (Hib) + Vacina Tríplice viral
c)Vacina Tríplice Viral + Vacina contra infecção por pneumococo
d)Vacina contra Influenza (Hib) + Vacina contra infecção por pneumococo+ Hep B
e)Vacina Hep B + Vacina contra infecção por pneumococo

28. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de apresentação: formas inaparentes, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD), podendo evoluir para o óbito. Dentre as afirmações abaixo, identifique as corretas

I) A fêmea do *Aedes aegypti* costuma picar as pessoas durante o dia, para viabilizar a maturação dos ovos.
II) Período de incubação varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias.
III)A DC tem a febre como primeiro sintoma, sendo geralmente alta (39º a 40°C), com início abrupto, associada à cefaléia, prostação, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema máculo papular e acompanhado ou não de prurido. Também pode haver quadros diarréicos, vômitos, náuseas e anorexia, podendo levar a sangramento gengivais e aparecimento de petéquias.

a)I e II b) todas c)II e III d)I e III e) III

29. Tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o *Mycobacterium tuberculosis*, também denominado de Bacilo de Koch (BK). O termo tuberculose se origina no fato da doença causar lesões chamadas tubérculos. Alguns fatores favorecem ao aumento da probabilidade de transmissibilidade da TB, são eles:

I) O potencial de contágio do caso índice: o doente bacilífero, isto é, com baciloscopia direta positiva, é a principal fonte de infecção;
II) A concentração de bacilos no ar contaminado: determinada pelo tipo de ambiente em que a exposição ocorreu: ambientes fechados, escuros ou com pouca ventilação;
III) Duração da exposição: o tempo que o doente e seus contatos respiram nesse ambiente;
IV) A suscetibilidade genética ou predisposição dos contatos.

a) I, II e III estão corretas
b) II e III estão corretas
c) II, III e IV estão corretas
d)Todas estão corretas
e) I e III estão corretas

30. O controle do Diabetes Mellitus é uma das prioridades do Ministério da Saúde. O método adequado para rastrear portadores de diabetes na população, e também para o controle diário da evolução do diabetes, é:

a) Glicemia capilar;
b) Glicosúria;
c) Curva glicêmica;
d) Glicemia plasmática;
e) Glicemia Jejum.

31. Uma enfermeira ao realizar uma visita domiciliar de um recém- nascido em sua área, realizou todas as orientações necessárias aos cuidados com RN dentre eles o calendário de consultas da puericultura. Segundo Ministério da Saúde, o agendamento para as consultas de puericultura devem obedecer ao seguinte calendário:

a) até 15 dias a 1º consulta, as subseqüentes serão com 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses.
b) até 15 dias a 1º consulta, as subseqüentes serão com 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses.
c) até 15 dias a 1º consulta, as subseqüentes serão com 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses
d) até 15 dias a 1º consulta, as subseqüentes serão com 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses.
e) até 15 dias a 1º consulta, as subseqüentes serão com 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 18 e 24 meses.

32. A amamentação deve ser exclusiva até aos 6 meses para todas as crianças em decorrência de sua completude no que se refere as necessidades, nutricionais, fisiológicas, emocionais e imunológicas. O leite de mães de crianças prematuras difere do leite de mães de crianças de termo. Uma das diferenças encontra se no:

a) Menor teor de lipídios
b) Menor teor de lactose
c) Menor teor de lactoferrina
d) Menor teor de calorias
e) Maior teor de lactose

33. Quanto ao envelhecimento e saúde da pessoa da idosa, analise as proposições abaixo e julgue (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças FALSAS.

I- Senescência compreende o envelhecimento como processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional do indivíduo e senilidade como o processo de envelhecimento associado a sobrecarga como doenças, acidentes e estresse emocional.

II- Quanto à funcionalidade da pessoa idosa, o desempenho avalia o potencial que a pessoa idosa tem para realizar a atividade, enquanto que a capacidade funcional avalia o que o idoso realmente faz no seu dia-a-dia.

III- São considerados fatores de risco para osteoporose: fratura anterior causada por pequeno trauma; sexo feminino; baixa massa óssea; raça branca ou asiática; idade avançada em ambos os sexos; história familiar de osteoporose ou fratura do colo do fêmur; menopausa precoce (antes dos 40 anos) não tratada; uso de corticoides.

a) VFV
b) FFV
c) FVF
d) FFF
e) VVV

34. Relacione as IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) aos agentes causadores para a síndrome de úlceras genitais.

(1) Sífilis
(2) Cancro Mole
(3) Donovanose
(4) LinfogranulomaVanéreo

( ) *Haemophilusducreyi*
( ) *Chlamydiatrachomatis*
( ) *Treponema pallidum*
( ) *klebsiellagranulomatis*

a) 2,4,1,3
b) 1,2,3,4
c) 4,1,3,2
d) 3,1,4,2
e) 1,3,2,4

35. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Avalie as afirmativas abaixo e destaque a(s) CORRETA(s).

I- As doenças cérebro-vascular, arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e doença arterial periférica são consideradas complicações de um descontrole da HAS.
II- A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação.
III- Para a verificação da PA é importante certificar-se que de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 60- 90 minutos e não está com as pernas cruzadas.
IV- Classifica-se Pressão Arterial (PA) Normal para adultos segundo o Manual do MS: PAS (mmHg) = 120-139 e PAD (mmHg) = 80-89

a) I, II e III estão corretas
b) II, III e IV estão corretas
c) Apenas a IV está correta
d) Todas estão corretas
e) I, III e IV estão corretas

36. Sabe-se que a ANVISA é um órgão que regulamenta, dentre outros processos, as boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Em relação ao processamento de produtos em um centro de saúde é CORRETO afirmar:

a) CME: unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde, sendo utilizada exclusivamente para produtos críticos.
b) A CME é classificada como CME Classe I, II e III. Está classificação se dá pelo tipo de produto para saúde, atendendo respectivamente produtos críticos, semi-críticos e não críticos.
c) Limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza.
d) São considerados produtos não críticos, produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
e) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.

37. A SES de Pernambuco conceitua as doenças negligenciadas como sendo aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas, além de serem consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Quanto as doenças negligenciadas marque a alternativa CORRETA.

a) As doenças negligenciadas, e os respectivos agentes etiológicos, que compõe o Projeto Sannar são: Tracoma (bactéria), Doenças de Chagas (Protozoário), Hanseníase (Bactéria), Filariose (nematoides), Esquistossomose (*Schistosoma)*, Helmitíase (Helmintos) e Tuberculose (bactéria).
b) As doenças negligenciadas, e os respectivos agentes etiológicos, que compõe o Projeto Sannar são: Tracoma (vírus), Doenças de Chagas (Protozoário), Hanseníase (Bactéria), Filariose (vírus), Esquistossomose (*Schistosoma)*, Helmitíase (Helmintos) e Tuberculose (bactéria).
c) As doenças negligenciadas, e os respectivos agentes etiológicos, que compõe o Projeto Sannar são: Tracoma (vírus), Doenças de Chagas (Protozoário), Hanseníase (Bactéria), Filariose (bactéria), Esquistossomose (*Schistosoma)*, Helmitíase (bactérias) e Tuberculose (bactéria).
d) As doenças negligenciadas, e os respectivos agentes etiológicos, que compõe o Projeto Sannar são: Tracoma (bactéria), Doenças de Chagas (Protozoário), Hanseníase (Bactéria), Filariose (bactéria), Esquistossomose (*Schistosoma)*, Helmitíase (Helmintos) e Tuberculose (vírus).
e) As doenças negligenciadas, e os respectivos agentes etiológicos, que compõe o Projeto Sannar são: Tracoma (bactéria), Doenças de Chagas (vírus), Hanseníase (vírus), Filariose (nematoides), Esquistossomose (*Schistosoma)*, Helmitíase (Helmintos) e Tuberculose (bactéria).

38. Quanto as contra-indicações e reações adversas da Vacina Pneumo – 10, avalie as proposições abaixo e marque a alternativa CORRETA.

I – A administração da vacina pneumococica 10 valente deve ser adiada em indivíduos que estejam sofrendo de doença febril aguda grave.

II- A vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) não deve, sob nenhuma circunstância, ser administrada por via intravascular ou intradérmica.

III - As reações adversas mais comuns observadas depois da vacinação primária foram rubor no local da injeção e irritabilidade.

a) I, II e III estão corretas
b) II e III estão corretas
c) I e II estão corretas
d) Apenas a III está correta
e) I e III estão corretas

39. O Manual de Procedimentos do MS, contem dentre os protocolos e técnicas a classificação de feridas. Marque a alternativa que define as feridas de natureza contusa.

a) São aquelas produzidas por agentes cortantes, afiados, capazes de cortar a pele produzindo ferida linear, com bordas regulares e pouco traumatizadas. O exemplo clássico é a ferida cirúrgica.
b) São aquelas produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de romper a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas. Essas feridas vão desde as simples lacerações até as complexas com sangramento, contaminação e perda de substância.
c) São aquelas cujo objeto é geralmente fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e tecidos subjacentes, produzindo lesão cutânea puntiforme ou linear, de bordas regulares ou não. A profundidade atingida não pode ser estabelecida à simples inspeção.
d) São as de mesmas características anteriores, cujo objeto é capaz de perfurar os tecidos e penetrar numa cavidade natural do organismo. Apresentam formato externo variável, geralmente linear ou puntiforme.
e) Constituem uma variedade de ferida perfurante ou penetrante, na qual o objeto vulnerante é capaz de penetrar e atravessar os tecidos de determinado órgão em toda a sua espessura.

40. Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que, isoladamente, é capaz de nutrir, de modo adequado, a criança nos primeiros seis meses de vida (BRASIL, 2004). Contudo, em situações especiais, se faz necessário a contraindicação da amamentação. Assinale a alternativa que representa situação de contraindicação permanente à amamentação:

a) Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama;
b) Crianças com diagnóstico de Fenilcetonúria;
c) Varicela: se a mãe apresentar vesículas na pele, cinco dias antes do parto ou, até, dois dias após o parto;
d) Abscesso mamário, até que ele tenha sido drenado e a antibioticoterapia iniciada;
e) Consumo de drogas de abuso (cocaína, maconha, ecstasy).